

اخبار

معاون سازمان بیمه سلامت خبر داد

تهیه بسته‌های خدماتی جدید برای بیماران خاص و صعب‌العلاج



معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، از بررسی بسته های خدماتی جدید و در دست اقدام بیمه سلامت در صندوق بیماری های خاص و صعب‌العلاج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، در خصوص نشست بررسی بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: در این نشست بسته‌های ابلاغی و جدید در دست اقدام برای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بسته خدمات برای بیماری‌های هیپاتیت ب، ALS، سلیاک، ۱۲ کد ژنریک داروی جدید سرطان، رادیوتراپی در مالکیتهای غیر دولتی، سقف جدید پاداش پیوند کلیه و سقف خدمات دندان پزشکی به استان‌ها ابلاغ شده است. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین بسته‌های جدید در دست اقدام شامل بسته‌های چهار بیماری (نورومیلیت، اوبتیکا، PCD، گلین باره، میاستنی گراووسی) آماده ابلاغ است.

وی تاکید کرد: بسته برای بیماری‌های سندروم نفروتیک اطفال، سندروم نفروتیک بزرگسال، آپوسسی آرآتا، نقص ایمنی اولیه، گوارشی(İBD)، به روز رسانی هموسبستنبوری کلاسیک و غیر کلاسیک (نقص کوپالاین، MTHFR) بر اساس استاندارد ابلاغی، به روز رسانی بسته‌های کاشت حلزون و تغییر سهم سازمان برای ۵ گروه بیماری خاص در بخش غیر دولتی در دست اقدام است.

کارشناس سازمان غذا و دارو تاکید کرد

توصیه های دارویی و درمانی به زائران اربعین



کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، توصیه های دارویی را به منظور حفظ سلامتی زائران اربعین حسینی یادآور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، الناز ذوقی، با اشاره به اطلاعیه ستاد اربعین در سامانه سماح، گفت: گروههایی از بیماران با بیماری‌های مزمن کنترل نشده و تشدید یافته دارند، از حضور در مراسم اربعین منع شده اند. همچنین لیست تعدادی از اقلام دارویی که همراه داشتن آنها در سفر به کشور عراق ممنوع است و قوانین مرتبط با آنها توسط وزارت امور خارجه منتشر شده است. وی افزود: سایر بیماران دارای بیماری‌های مزمن مانند پرفشاری خون و دیابت باید داروهای خود را در جعبه اصلی خود با لیبل مشخص همراه داشته باشند. پیشنهاد می‌شود این بیماران لوازم اندازه گیری قندخون و فشارخون را نیز همراه تعدادی باشند. این کارشناس سازمان غذا و دارو یادآور شد: در صورت وقوع علائم همراه مانند تب، درد شکمی، اسهال خونی و استفراغ حتماً باید به مرکز درمانی مراجعه شود. جبران مایعات به کمک محلول‌های خوراکی ORS صورت می‌گیرد. در صورت عدم دسترسی به ORS محلول مشابه از افزودن نصف قاشق چای‌خوری نمک و ۴ قاشق غذاخوری شکر به یک لیتر آب جوشیده سرد شده قابل دستیابی است. ذوقی تصریح کرد: در خصوص عفونت‌های تنفسی برخی از ویروس‌های عامل از طریق دست آلوده به مخاط فرد بیمار منتقل می‌شود همراه داشتن مایون و پنجاه و هفتمین سله منتظم دست‌ها با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه یا ضدعفونی نمودن دست‌ها با ضدعفونی کننده‌های استاندارد بر پایه الکل می‌تواند از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از انتقال این ویروس باشد. به گفته وی، ویروس‌هایی که از طریق قطرات تنفسی منتقل می‌شود استفاده از ماسک کمک کننده است. در صورت وجود علائم تب، سرفه، عطسه، درد گلو و آب ریزش بینی بهتر است حتماً اقدام از حضور در اجتماعات پرهیز شود. مصرف کافی مایعات گرم و استراحت می‌تواند بهبود علائم را تسریع کند.

احتمال شیوع آبله «آبله میمون» در ایران کم است

جهان در کابوس همه‌گیری ویروس «ام‌پاکس»

گروه جامعه - ویروس «ام‌پاکس» یا همان «آبله میمون» بیماری نادر ویروسی است که علائم خفیفی مانند آبله ایجاد می‌کند. این بیماری از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده یا سطوح آلوده، مایعات بدن فرد آلوده و غیره منتقل می‌شود. دوره کمون این بیماری ۲۱ روز است و نیاز به داروی خاصی برای درمان ندارد.



مشاوران سازمان بهداشت جهانی در گزارشی هشدار دادند که شیوع آبله میمون در ایران در حال افزایش است.

بر اساس اعلام سازمان هوشناسی، در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای هوا در پنج ایستگاه هوشناسی جنوب غرب کشور به ۵۰ درجه سلسیوس رسید.

به گزارش ایلنا، این ایستگاه‌ها به ترتیب شامل بستان با دمای ۵۰٫۸، اهواز ۵۰٫۴، آبادان ۵۰٫۲، دزفول ۵۰٫۲ و دهلران با دمای ۵۰٫۱ درجه سلسیوس هستند همچنین در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای هوا در حداقل ۴۵ ایستگاه هوشناسی به ۴۵ درجه و بیشتر از آن رسیده است.

مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هوشناسی کشور اعلام کرده است که گرمای هوا در جنوب غرب کشور همچنان ادامه دارد. این مرکز پیش بینی کرده امروز و فردا (۲۸ و ۲۹ مرداد) نیز دمای هوا در برخی ایستگاه‌های هوشناسی خوزستان و ایلام به محدوده ۵۰ درجه و بالاتر از آن برسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هوشناسی کشور، اداره کل هوشناسی خوزستان نیز اعلام کرده که با استقرار جریانات جنوبی در ساحل شرقی و مناطق جنوب شرق استان، میزان رطوبت هوا افزایش می‌یابد و به‌تدریج این شرایط به مناطق مرکزی، نوار ساحلی و مناطق جنوب استان گسترش می‌یابد.

شناسایی راه‌های دیگر انتقال ویروس آبله میمون انتقال این ویروس همچنین از طریق تعاملات طولانی‌مدت و رودرو مانند صحبت کردن نیز ممکن است. از سوی دیگر، ویروس آبله «ام» می‌تواند از طریق تماس با اشیا، پارچه‌ها و سطوحی که پس از بیماری شده‌اند و به‌زودی قاره آفریقا را فرا می‌گیرد و از آنجا که یک مورد هم در سوئد دیده شده این خطر افزایش یافته، اما به نظر من باید‌بهداشت جهانی اقدام جدی ر جلوگیری از این بیماری در آفریقا انجام دهد.»
رضائی توضیح می‌دهد: «گیت تشخیص در ایران وجود دارد و در زمینه شناسایی مشکل نداریم، اما مهم این‌است که مسافران کنترل و تشخیص سریع انجام و بیمار ایزوله شود. ضمن اینکه گاهی مردم و پزشکان در این زمینه بسیار مهم است.»

این بیماری به طور معمول بین دو تا چهار هفته طول می‌کشد. دوره نهان آبله میمونی پس از ابتلی افراد به ویروس بین پنج تا ۲۱ روز است؛ به عبارت دیگر علائم بیماری در مبتلایان بین پنج تا ۲۱ روز پس از ورود ویروس به بدن بروز می‌کند.

علائم آبله «ام» چیست؟
در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

در این همه‌گیری تازه، برخلاف همه‌گیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و رخ‌ها که پیشتر روی سینه، دست‌ها و پاها بروز می‌کرد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی، از جمله زیر باوها و دو طرف و پشت گردن، از دیگر علائم این بیماری محسوب می‌شود. این عفونت‌ها می‌توانند دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند و تشخیص آن با نمونه‌برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است.

اخبار

دمای هوای ۵ ایستگاه هوشناسی کشور به ۵۰ در جه رسید



بر اساس اعلام سازمان هوشناسی، در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای هوا در پنج ایستگاه هوشناسی جنوب غرب کشور به ۵۰ درجه سلسیوس رسید.

به گزارش ایلنا، این ایستگاه‌ها به ترتیب شامل بستان با دمای ۵۰٫۸، اهواز ۵۰٫۴، آبادان ۵۰٫۲، دزفول ۵۰٫۲ و دهلران با دمای ۵۰٫۱ درجه سلسیوس هستند همچنین در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای هوا در حداقل ۴۵ ایستگاه هوشناسی به ۴۵ درجه و بیشتر از آن رسیده است.

مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هوشناسی کشور اعلام کرده است که گرمای هوا در جنوب غرب کشور همچنان ادامه دارد. این مرکز پیش بینی کرده امروز و فردا (۲۸ و ۲۹ مرداد) نیز دمای هوا در برخی ایستگاه‌های هوشناسی خوزستان و ایلام به محدوده ۵۰ درجه و بالاتر از آن برسد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هوشناسی کشور، اداره کل هوشناسی خوزستان نیز اعلام کرده که با استقرار جریانات جنوبی در ساحل شرقی و مناطق جنوب شرق استان، میزان رطوبت هوا افزایش می‌یابد و به‌تدریج این شرایط به مناطق مرکزی، نوار ساحلی و مناطق جنوب استان گسترش می‌یابد.

دمای هوا در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش می‌یابد



سازمان هوشناسی اعلام کرد: کاهش دما در نوار شمالی کشور و دامنه های جنوبی البرز طی هفته جاری به نسبت محسوس است، اما در غرب و جنوب غرب کشور تا اواسط هفته همچنان گرمای هوا تداوم دارد.

به گزارش ایرنا از هوشناسی، امروز (یکشنبه) در برخی مناطق شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم و مرکزی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

دوشنبه و سه شنبه این وضعیت در برخی نقاط گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی در شرق تهران و شمال سمنان ادامه دارد.

با توجه به جریان‌های گرم و مرطوب جنوبی در ۲ روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و فارس، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

سه شنبه تا پنجشنبه بارش در این مناطق تشدید می‌شود و گستره آن مناطقی از کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، جنوب چهار محال و بختیاری و خوزستان را نیز فرا می‌گیرد.

طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، غرب، نواحی مرکزی و دامنه های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

دریای خزر امروز و دریای عمان تنگه هرمز و شرق خلیج فارس امروز و فردا مواج است.

آسمان امروز تهران نیمه‌ابی در بعضی ساعت‌ها با رافزایش باد، احتمال گرد و خاک و رگبار باران همراه است. بیشینه دمای امروز پایتخت ۳۵ و کمینه دمای آن ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد بود.

اخبار



بانک مرکزی هشدار داد. وی با صدور نامه‌ای هشداري برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، خواستار اصلاح محدودیت زمانی ثبت نام تسهیلات تکلیفی در سامانه شد. به گزارش ایسنا، طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج موضوع غیرقابل انکاری است که سالانه شبکه بانکی و به دنبال آن زوجین در شرف آغاز زندگی مشترک با آن روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی تکراری و بی‌سرانجام که هر سال داستان آن از سر گرفته می‌شود و درنهایت کار به انتقاد و هشدار از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسد.